


ЕСТЬ ВАКЦИНА! ДИФТЕРИЯ

Дифтерия -
инфекционное
заболевание
с летальностью до

10%


даже в случае
правильного лечения

Осложнения:
асфиксия вследствие
закрытия просвета
дыхательных путей
отеком
и пленками, 
миокардит,
полинейропатия,
паралич, почечная
недостаточность

Эпидемия дифтерии
среди непривитого
населения России
привела к смерти

>4000

человек в 90-е годы
XX века

Симптомы:
повышение
температуры,
сухой кашель, 
охриплость голоса,
боли в горле,
образование
пленчатых налётов на
миндалинах и нёбе

Необходима
ревакцинация против
дифтерии взрослых
каждые

10

лет



Вакцинация - самая
эффективная мера
профилактики
дифтерии;
проводится
трехкратно детям в 3,
4,5 и 6 месяцев с
ревакцинациями в
18, 6-7 и 14 лет

ДИФТЕРИЯ

Пути заражения:



- Воздушно-капельный



- Контактнo-бытовой

Симптомы:



- Повышенная температура
- Общая слабость
- Боль в горле



- Затрудненное дыхание
- Отек и характерные пленки на слизистой
- Отек шеи

Осложнения:



- Тяжелые поражения сердца и почек
- Поражение нервной системы (параличи, парезы)



- Инфекционно-токсический шок
- Летальный исход

Чтобы избежать заражения:

1. Пройти обследование, чтобы определить иммунитет к дифтерии
2. Делать прививки детям, согласно календарю прививок, и прививаться каждые 10 лет.



bigmir)net



Внимание: корь

Источник кори:
больной человек.




Клиническая картина:

- насморк;
- конъюнктивит;
- сыпь.

Возможные осложнения:

- отит;
- гайморит;
- поражение роговицы глаз;
- энцефалит;
- пневмония.



Иммунизация — основная защита от кори!

Дети: вакцинация в один год, ревакцинация в шесть лет.

Ранее не привитые и не болевшие корью взрослые (18–55 лет): две прививки с интервалом не менее трех месяцев. Устойчивый иммунитет формируется после двукратного введения вакцины.

При первых признаках заболевания у себя или ближайшего окружения немедленно обратитесь в медучреждение.